

## D. Tabellarische Übersicht des Impfkalenders für Kinder, Jugendliche und Erwachsene

### 1. Impfkalender des Gratiskinderimpfprogrammes Säuglinge und Kleinkinder

Alter→ ↓ Impfung	1. Lebensjahr						2. Lebensjahr
	7. Woche	3. Monat	5. Monat	6. Monat	11. Monat	12. Monat	
<b>Rotavirus (RV)</b>	RV 2 bzw. 3, Teilimpfungen Abstand mind. 4 Wo. in Abhängigkeit vom verwendeten Impfstoff						
<b>Diphtherie (DIP) Tetanus (TET) Pertussis (PEA) Poliomyelitis (IPV) Haemophilus infl. B (HIB) Hepatitis B (HBV)</b>		1. 6-fach	2. 6-fach			3. 6-fach frühestens 6 Mo. nach 2. Teilimpfung	
<b>Pneumokokken (PNC) (</b>		1. PNC	2. PNC			3. PNC frühestens 6 Mo. nach 2. Teilimpfung	
<b>Mumps Masern (MMR) Röteln</b>					MMR 2 Impfungen Abstand mind. 4 Wo.		

Tabelle 1: Impfkalender des Gratiskinderimpfkonzepts für Säuglinge und Kleinkinder

### Schulkinder

Alter→ ↓ Impfung	7. Jahr	8. Jahr	9. Jahr	12. Jahr	13. Jahr	15. Jahr
<b>Diphtherie (dip) Tetanus (TET) Pertussis (PEA) Poliomyelitis (IPV)</b>	4-fach				3-fach (dip+TET+PEA) für Kinder, die vorher nur eine dip+Tet+IPV Impfung erhalten haben	
<b>Hepatitis B (HBV)</b>	Grundimmunisierung (0/1/6 Monate) oder Auffrischung					
<b>Mumps Masern (MMR) Röteln</b>	MMR (Nachholen bei Kindern, die keine oder nur eine Impfung erhalten haben und nicht immun sind)					
<b>Meningokokken (MEC4)</b>				MEC4		

Tabelle 2: Impfkalender des Gratiskinderimpfkonzepts für Schulkinder

## 2. Impfkalender aller empfohlener Impfungen

### Säuglinge und Kleinkinder

Alter→ ↓Impfung	1. Lebensjahr							2. Lebensjahr			5. Jahr	6. Jahr
	7. Wo	3. Mo.	5. Mo.	6. Mo.	7. Mo.	11. Mo.	12. Mo.	13. Mo.	14. Mo.	20.-24. Mo.		
<b>Rotavirus (RV)</b>	RV 2 bzw. 3, Abstand mind. 4 Wo. in Abhängigkeit vom verwendeten Impfstoff											
<b>Diphtherie (DIP) Tetanus (TET) Pertussis (PEA) Poliomyelitis (IPV) Haemophilus infl. B (HIB) Hepatitis B (HBV)</b>		1. 6-fach	2. 6-fach				3. 6-fach frühestens 6 Mo. nach 2. Teilimpfung					
<b>Pneumokokken (PNC)</b>		1. PNC	2. PNC				3. PNC frühestens 6 Mo. nach 2. Teilimpfung					
<b>Mumps Masern (MMR) Röteln</b>						MMR 2 Impfungen Abstand mind. 4 Wo.						
<b>Meningokokken<sup>1</sup></b>						1 x MEC-C						
<b>FSME</b>							1. FSME	2. FSME	3. FSME	FSME		
<b>Varizellen (VZV)</b>						VZV 2 Impfungen Abstand mind. 4, vorzugsweise 6 Wo.						
<b>Hepatitis A (HAV)</b>								1.HAV	2.HAV			
<b>Influenza (IV)<sup>2</sup></b>					IV					IV	IV	IV

Tabelle 3: Impfkalender aller empfohlenen Impfungen für Säuglinge und Kleinkinder

Kostenfrei
  Nicht kostenfrei
  Indikationsimpfung (nicht kostenfrei)

<sup>1</sup> MEC-C: konjugierter MenC Impfstoff bei Erstimpfung ab dem 12. Monat nur eine Dosis (kann im 3. Monat erstmals geimpft werden, dann 2. im Abstand von min. 8 Wochen). (Es kann auch ein kombinierter konjugierter Impfstoff verwendet werden welcher eine C Komponente enthält (MEC4)).

<sup>2</sup> IV: bei Kindern werden bei Erstimmunisierung (bis zum 8. Lebensjahr) 2 Impfungen mit min. 4 Wochen Abstand empfohlen

## Schulkinder

Alter→ ↓Impfung	7. Jahr	8. Jahr	9. Jahr	10. Jahr	11. Jahr	12. Jahr	13. Jahr	14. Jahr	15. Jahr
<b>Diphtherie (dip)</b> <b>Tetanus (TET)</b> <b>Pertussis (PEA)</b> <b>Poliomyelitis (IPV)</b>	4-fach						(3-fach)		
<b>Hepatitis B (HBV)</b>	Grundimmunisierung (0/1/6 Monate) oder Auffrischung								
<b>Mumps</b> <b>Masern (MMR)</b> <b>Röteln</b>	(MMR Nachholen bei Ungeimpften oder nur 1x geimpften)								
<b>Humane Papillomviren (HPV)</b>			3 x HPV (Erste Impfung ab dem 9. Lebensjahr)						
<b>Varizellen (VZV)</b>			2 x VZV (wenn nicht bereits 2x geimpft oder Erkrankung durchgemacht)						
<b>FSME</b>				FSME					FSME
<b>Meningokokken (MEC4)</b>						MEC4			
<b>Influenza (IV)</b>	IV jährlich								

Tabelle 4: Impfkalendar aller empfohlenen Impfungen für Schulkinder

Kostenfrei
  Nicht kostenfrei

## Erwachsene

Erwachsene mit vorliegender Grundimmunisierung gemäß den Empfehlungen \*

Alter→ ↓Impfung	18.-20. Jahr	30. Jahr	40. Jahr	50. Jahr	60. Jahr	65. Jahr	70. Jahr	75. Jahr	80. Jahr usw.
<b>Diphtherie (dip)</b> <b>Tetanus (TET)</b> <b>Pertussis (PEA)</b> <b>Poliomyelitis (IPV)</b>	alle 10 Jahre auffrischen					alle 5 Jahre auffrischen			
<b>Humane Papillomviren (HPV)</b>	gegebenenfalls nachholen								
<b>Mumps</b> <b>Masern (MMR)</b> <b>Röteln</b>	gegebenenfalls bis 45 Jahre nachholen								
<b>FSME</b>	alle 5 Jahre auffrischen					alle 3 Jahre auffrischen			
<b>Pneumokokken (PNC)<sup>2</sup></b>				PNC13 / nach 1 Jahr PPV23 <sup>2</sup>					
<b>Influenza (IV)</b>	IV jährlich								

Tabelle 5: Impfkalendar aller empfohlenen Impfungen für Erwachsene

\* [Nachholimpfplan](#) für Personen konsultieren, bei denen die Grundimmunisierung ganz oder teilweise fehlt

<sup>2</sup> Details siehe Abschnitt Pneumokokken